



気孔付

こりと痛みに
はりぐすり



こりと痛みに

第3類医薬品

大判

気孔付 ビタミンE配合
ワイドパスE



大協薬品工業株式会社



気孔付

はりぐすり

配置期限

ロット番号



大協薬品工業株式会社

製造販売元

富山市水橋 173

電話：076-479-1313

お客様相談窓口 受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



:箱



:外装フィルム

鎮痛消炎薬 **ワイドパステ** 第3類医薬品



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)

74mm×52mm 大判20枚入 ¥400+税

成分及び分量 1.0m²中

dl-カンフル…1.80g, サリチル酸メチル…9.00g, ハッカ油…1.20g, l-メントール…4.50g, トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)…0.50g, ノニル酸ワニリルアミド…0.01g 添加物として、ポリブテン, 生ゴム, ポリイソブチレン, エステルガム, テルペン樹脂, 沈降炭酸カルシウム, 酸化チタン, アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂, ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル, 天然ゴムラテックス, 香料, 赤色405号, 黄色205号を含有します。