

一般用医薬品・要指導医薬品 詳細表示

項目	内容																		
医薬品区分	配置用医薬品																		
薬効分類	ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等）																		
承認販売名																			
製品名	イソビタンD2																		
製品名（読み）	イソビタンD 2																		
製品の特徴																			
使用上の注意	■相談すること 1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹 消化器：胃部不快感，下痢 2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること																		
効能・効果	滋養強壮，虚弱体質，肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給																		
効能関連注意																			
用法・用量	成人（15歳以上）1日1回1本（100mL）を服用する。																		
用法関連注意	●用法及び用量を厳守すること。 ●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。																		
成分分量	1日量1本(100mL)中 <table><tr><th>成分</th><th>分量</th></tr><tr><td>チアミン硝化物</td><td>10mg</td></tr><tr><td>リボフラビンリン酸エステルナトリウム</td><td>3mg</td></tr><tr><td>ピリドキシン塩酸塩</td><td>50mg</td></tr><tr><td>ニコチン酸アミド</td><td>30mg</td></tr><tr><td>無水カフェイン</td><td>50mg</td></tr><tr><td>L-アルギニン塩酸塩</td><td>40mg</td></tr><tr><td>L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム</td><td>1000mg</td></tr><tr><td>ローヤルゼリー</td><td>50mg</td></tr></table>	成分	分量	チアミン硝化物	10mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	3mg	ピリドキシン塩酸塩	50mg	ニコチン酸アミド	30mg	無水カフェイン	50mg	L-アルギニン塩酸塩	40mg	L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	1000mg	ローヤルゼリー	50mg
成分	分量																		
チアミン硝化物	10mg																		
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	3mg																		
ピリドキシン塩酸塩	50mg																		
ニコチン酸アミド	30mg																		
無水カフェイン	50mg																		
L-アルギニン塩酸塩	40mg																		
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	1000mg																		
ローヤルゼリー	50mg																		
添加物	白糖，D-ソルビトール，ハチミツ，dl-リンゴ酸，クエン酸水和物，安息香酸ナトリウム，エドト酸カルシウム二ナトリウム，香料，ビタミンE，バニリン，エタノール																		
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。																		

	(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。 (5) 加温, 冷凍はさけること。
消費者相談窓口	会社名：田村薬品工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 電話：06-6203-5151 受付時間：10：00～17：00（土, 日, 祝日を除く）
製造販売会社	田村薬品工業（株） 添付文書情報： J0607000506_05_A.pdf 会社名：田村薬品工業株式会社 住所：奈良県御所市西寺田50
販売会社	
剤形	液剤
リスク区分	第3類医薬品