

鼻炎用内服薬

プロピン鼻炎JⅡ

【特徴】

従来、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりと言えば、かぜの代名詞のように言われてきましたが、最近では、花粉やハウスダストによって起こるアレルギー性の鼻炎にかかる人が大変増えています。いずれの場合にも、早めに治さないと鼻みずや鼻づまりが更にひどくなり、不快症状が続いてなかなか治らないようになってしまいます。鼻にきたら、この**プロピン鼻炎JⅡ**服用すると鼻みず、鼻づまりが緩和され、鼻の通りがよくなってきます。また頭重やなみだ目といった不快症状も同時におさまってきます。**プロピン鼻炎JⅡ**は、7歳のお子様から大人まで服用していただける飲みやすい小さなカプセルです。早速お試しください。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 前立腺肥大による排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
- 長期連用しないでください。

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難、むくみ
 - 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
 - モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
 - かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、ふるえ、動悸を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労 感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツ ブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、 急激に悪化する。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法及び用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	2 カプセル	3 回
7 歳以上15歳未満	1 カプセル	
7 歳未満	服用しないでください	

＜用法及び用量に関連する注意＞

(1) 本剤は定められた用法及び用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し
て裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください（誤ってそのまま
飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりま
す。）。

＜PTPシートの取り出し図＞



成分及び分量 6カプセル（1日量）中

成 分	分 量	添加物としてトウモロコシ デンプン、ステアリン酸 Mg、ラウリル硫酸Na、 ゼラチン、その他2成分を 含有します。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	
ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg	
塩酸ブソイドエフェドリン	180mg	
無水カフェイン	120mg	
グリチルリチン	60mg	

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。

(4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元
富山めぐみ製薬株式会社
富山県富山市三番町3-10

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 ☎076(421)5531

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）