

一般用医薬品・要指導医薬品 詳細表示

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	葛根湯
承認販売名	
製品名	プリドミン葛根湯内服液
製品名（読み）	プリドミンカクコントウナイフクエキ
製品の特徴	
使用上の注意	■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる） 1. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと ■相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること （1）医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。 （4）胃腸の弱い人。 （5）発汗傾向の著しい人。 （6）高齢者。 （7）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 （8）次の症状のある人。むくみ、排尿困難 （9）次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 〔症状の名称：症状〕 偽アルドステロン症：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果	かぜの初期症状（発熱，さむけ，頭痛，鼻水，鼻づまり，のどの痛み，肩・首筋のこわばり）		
効能関連注意			
用法・用量	〔年齢：1回量：1日服用回数〕 成人（15歳以上）：1本：3回食間に服用する。 15歳未満：服用しないこと。		
用法関連注意	（1）用法・用量を厳守すること。 （2）本品は1回1本飲みきりです。 （3）本剤には生薬エキ스가配合されているために，まれに沈殿を生じることがありますが，薬効には変わりありません。よく振ってから服用すること。		
成分分量	1日量3本(90mL)中		
	成分	分量	内訳
	葛根湯軟エキス	8300mg	（カッコン8g，マオウ・タイソウ各4g，ケイヒ・シャクヤク各3g，カンゾウ2g，ショウキョウ1g）
添加物	ハチミツ，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，パラベン，安息香酸ナトリウム，pH調節剤，香料，エタノール		
保管及び取扱い上の注意	（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。 （2）小児の手の届かない所に保管すること。 （3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。 （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。		
消費者相談窓口	会社名：田村薬品工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 電話：06-6203-5151 受付時間：10：00～17：00（土，日，祝日を除く）		
製造販売会社	田村薬品工業（株） 添付文書情報： J0601008782_06_A.pdf 会社名：田村薬品工業株式会社 住所：奈良県御所市西寺田50		
販売会社			
剤形	液剤		
リスク区分	第2類医薬品		